

15. DOWODZENIE VI: WTÓRNE REGUŁY INFERENCJI I REGUŁY PODSTAWIANIA

Cele i wprowadzenie

W systemie SD dla każdego spójnika istnieje reguła wprowadzania i reguła eliminacji tegoż spójnika. Niemniej jednak dowodzenie za pomocą jedenastu reguł pierwotnych bywa uciążliwe, jak mieliśmy już okazję zaobserwować widzieliśmy w poprzednim temacie. Dlatego ten podstawowy repertuar reguł pierwotnych często bywa uzupełniany wtórnymi regułami inferencji (opartymi na dowodzie logicznego wynikania) oraz regułami podstawiania (opartymi na dowodzie logicznej równoważności).

- Pojęcie wtórnych reguł inferencji
- Rozróżnienie reguł inferencji i reguł podstawiania

15.1. Wtórne reguły inferencji

Poznaliśmy już przykład wtórnej reguły inferencji – była nią regułą MTP.

$\begin{array}{l l} i. & p \vee q \\ j. & \sim q \\ \hline \text{➤} & p \end{array} \quad \text{MTP } i, j$	$\begin{array}{l l} i. & p \vee q \\ j. & \sim p \\ \hline \text{➤} & q \end{array} \quad \text{MTP } i, j$
---	---

Możemy teraz dowieść, że reguła MTP jest istotnie regułą wtórną dla systemu SD. Aby to uczynić musimy wykazać, że wniosek uprawomocniony przez regułę MTP można wyprowadzić z przesłanek i oraz j za pomocą wyłącznie reguł pierwotnych – nie używając MTP.

i	$p \vee q$	
j	$\sim q$	
+1	p	Zał. (\vee Elim)
+2	p	R +1
+3	q	Zał. (\vee Elim)
+4	$\sim p$	Zał. (\sim Elim)
+5	$\sim q$	R j
+6	q	R +3
+7	p	\sim Elim (+4)–(+5), (+4)–(+6)
+8	p	\vee Elim i , (+1)–(+2), (+3)–(+7)

W ten sposób przedstawiamy ciąg kroków, którymi moglibyśmy zastąpić każde zastosowanie reguły MTP.

Inną często dodawaną regułą jest reguła zwana *modus tollendo tollens*:

$$\begin{array}{l|l} i. & p \rightarrow r \\ j. & \sim r \\ \text{➤} & \sim p \end{array} \quad \text{MTT } i, j$$

Wprowadza się też zwykle regułę sylogizmu hipotetycznego:

$$\begin{array}{l|l} i. & p \rightarrow q \\ j. & q \rightarrow r \\ \text{➤} & p \rightarrow r \end{array} \quad \text{HS } i, j$$

Ćwiczenie I.

Dowiedź, że następujące reguły inferencji mogłyby być dodane jako reguły wtórne do systemu SD:

- | | | |
|---|--|--|
| <p>(a)</p> $\begin{array}{l l} i. & p \equiv r \\ \text{➤} & p \rightarrow r \end{array} \quad \text{RZE } i$ | <p>(b)</p> $\begin{array}{l l} i. & p \equiv r \\ \text{➤} & r \rightarrow p \end{array} \quad \text{RZE } i$ | <p>(c)</p> $\begin{array}{l l} i. & p \rightarrow r \\ j. & r \rightarrow p \\ \text{➤} & p \equiv r \end{array} \quad \text{RZW } i, j$ |
| <p>(d)</p> $\begin{array}{l l} i. & p \vee q \\ j. & \sim p \\ \text{➤} & q \end{array} \quad \text{MTP } i, j$ | <p>(e)</p> $\begin{array}{l l} i. & p \rightarrow r \\ j. & \sim r \\ \text{➤} & \sim p \end{array} \quad \text{MTT } i, j$ | <p>(f)</p> $\begin{array}{l l} i. & p \rightarrow q \\ j. & q \rightarrow r \\ \text{➤} & p \rightarrow r \end{array} \quad \text{HS } i, j$ |
| <p>(g)</p> $\begin{array}{l l} i. & p \rightarrow r \\ \text{➤} & (r \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow q) \end{array} \quad \text{HHS } i$ | <p>(h)</p> $\begin{array}{l l} i. & p \rightarrow r \\ \text{➤} & (q \rightarrow p) \rightarrow (q \rightarrow r) \end{array} \quad \text{HHS } i$ | |
| <p>(i)</p> $\begin{array}{l l} i. & p \rightarrow r \\ j. & p \rightarrow s \\ \text{➤} & p \rightarrow (r \bullet s) \end{array} \quad \text{MNI}$ | <p>(j)</p> $\begin{array}{l l} i. & p \rightarrow r \\ j. & q \rightarrow s \\ \text{➤} & (p \bullet q) \rightarrow (r \bullet s) \end{array} \quad \text{MPNI}$ | |
| <p>(k)</p> $\begin{array}{l l} i. & p \rightarrow r \\ j. & q \rightarrow r \\ \text{➤} & (p \vee q) \rightarrow r \end{array} \quad \text{DPi}$ | <p>(l)</p> $\begin{array}{l l} i. & p \rightarrow r \\ j. & q \rightarrow s \\ \text{➤} & (p \vee q) \rightarrow (r \vee s) \end{array} \quad \text{DPNi}$ | |
| <p>(m)</p> $\begin{array}{l l} i. & p \rightarrow (q \rightarrow r) \\ j. & p \rightarrow q \\ \text{➤} & p \rightarrow r \end{array} \quad \text{RFi}$ | <p>(n)</p> $\begin{array}{l l} i. & p \rightarrow (q \rightarrow r) \\ \text{➤} & (p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r) \end{array} \quad \text{RFi}$ | |
| <p>(o)</p> $\begin{array}{l l} i. & p \\ \text{➤} & r \rightarrow p \end{array} \quad \text{RS } i$ | <p>(p)</p> $\begin{array}{l l} i. & \sim p \rightarrow p \\ \text{➤} & p \end{array} \quad \text{RC } i$ | <p>(q)</p> $\begin{array}{l l} i. & \sim p \\ \text{➤} & p \rightarrow r \end{array} \quad \text{RDS } i$ |
| <p>(r)</p> $\begin{array}{l l} i. & (p \bullet \sim r) \rightarrow \sim p \\ \text{➤} & p \rightarrow r \end{array} \quad \text{IWi}$ | <p>(s)</p> $\begin{array}{l l} i. & (p \bullet \sim r) \rightarrow r \\ \text{➤} & p \rightarrow r \end{array} \quad \text{IWi}$ | |

15.2. Reguły inferencji a reguły podstawiania

Aby dołączyć do systemu SD regułę inferencji postaci:

$$\begin{array}{l|l} i_1. & \alpha_1 \\ & \dots \\ i_k. & \alpha_k \\ \hline \triangleright & \beta \quad \text{RI } i_1, \dots, i_k \end{array}$$

jako regułę wtórną systemu SD, trzeba wykazać, że wniosek β wynika logicznie ze zbioru $\{\alpha_1, \dots, \alpha_k\}$, czyli że $\{\alpha_1, \dots, \alpha_k\} \vdash \beta$. Wtórne reguły inferencji dodawane są zatem do systemu inferencji na podstawie wykazania, że wniosek wynika logicznie z przesłanek.

Systemy dedukcji naturalnej uzupełnia się często o jeszcze jeden – bardzo użyteczny – rodzaj reguł, tzw. *reguły podstawiania*. Podczas gdy wtórne reguły inferencji dodaje się w oparciu o dowód wskazujący, że pewne zdania wynikają logicznie z innych zdań, reguły podstawiania uzasadniane są w oparciu o dowód logicznej równoważności pewnych zdań. Reguły te – choć bardzo intuicyjne – zasadniczo się jednak różnią od reguł inferencji w użyciu. Nie bez przyczyny zapisuje się je też w różny sposób. Aby dołączyć do systemu SD regułę podstawiania postaci:

$$\alpha \leftrightarrow \beta \quad \text{RP}$$

jako regułę wtórną systemu SD, trzeba wykazać, że α i β są logicznie równoważne, tj. że $\{\alpha\} \vdash \beta$ oraz że $\{\beta\} \vdash \alpha$.

15.3. Reguły podstawiania

Oto reguły podstawiania, które warto dołączyć do systemu:

Podwójna negacja (Neg)

$$p \leftrightarrow \sim \sim p$$

Idempotentność (Idem)

$$p \bullet p \leftrightarrow p$$

$$p \vee p \leftrightarrow p$$

Przemienność (Przem)

$$p \vee r \leftrightarrow r \vee p$$

$$p \bullet r \leftrightarrow r \bullet p$$

$$p \equiv r \leftrightarrow r \equiv p$$

Łączność (Łącz)

$$p \vee (q \vee r) \leftrightarrow (p \vee q) \vee r$$

$$p \bullet (q \bullet r) \leftrightarrow (p \bullet q) \bullet r$$

Rozdzielność (Rozdz)

$$p \vee (q \bullet r) \leftrightarrow (p \vee q) \bullet (p \vee r)$$

$$p \bullet (q \vee r) \leftrightarrow (p \bullet q) \vee (p \bullet r)$$

De Morgan (DeM)

$$\sim(p \vee r) \leftrightarrow \sim p \bullet \sim r$$

$$\sim(p \bullet r) \leftrightarrow \sim p \vee \sim r$$

Implikacja (Impl)

$$p \rightarrow r \leftrightarrow \sim p \vee r$$

Negacja implikacji (NegImpl)

$$\sim(p \rightarrow r) \leftrightarrow p \bullet \sim r$$

Równoważność (Równ)

$$p \equiv r \leftrightarrow (p \rightarrow r) \bullet (r \rightarrow p)$$

$$p \equiv r \leftrightarrow (p \bullet r) \vee (\sim p \bullet \sim r)$$

Negacja równoważności (NegRówn)

$$\sim(p \equiv r) \leftrightarrow (p \bullet \sim r) \vee (\sim p \bullet r)$$

Eksportacja (Eksp)

$$p \rightarrow (q \rightarrow r) \leftrightarrow (p \bullet q) \rightarrow r$$

Transpozycja (Transp)

$$p \rightarrow r \leftrightarrow \sim r \rightarrow \sim p$$

Absorpcja (Abs)

$$p \rightarrow r \leftrightarrow p \rightarrow (p \bullet r)$$

Niektóre z tych reguł, jak na przykład reguła podwójnej negacji *Neg*, czy reguły łączności i przemienności, są niezwykle wręcz intuicyjne. Stosujemy je z powodzeniem i bez wahania w rozumowaniu codziennym.

Ćwiczenie II.

Dowiedź, że można uzupełnić system SD o wszystkie podane wyżej reguły podstawiania.

15.3.1. Reguły podstawiania stosują się . . .

Reguły podstawiania są niezwykle intuicyjne, niemniej jednak ich stosowanie w dowodzeniu różni się od stosowania reguł inferencji pod dwoma ważnymi względami.

. . . dwukierunkowo

W przeciwieństwie do reguł inferencji, reguły podstawiania można stosować «w dwie strony». W następującym dowodzie obydwie zastosowania reguły *Neg* są prawidłowe:

1.	$\sim\sim A$		Zał.
2.	A		Neg 1
3.	$\sim\sim\sim A$		Neg 1

Nieuzasadniony byłby oczywiście krok:



4.	$\sim\sim\sim\sim A$		Neg 1
----	----------------------	--	-------

Aby wprowadzić $\sim\sim\sim\sim A$ należałoby zastosować reguły *Neg* do wiersza 3 a nie 1.

. . . również do nieswobodnie stojących zdań

Jak pamiętamy, reguły inferencji stosują się tylko do swobodnie stojących zdań. Reguły podstawiania natomiast można zastosować również do członów zdań. Następujące zastosowania reguły *Neg* są prawidłowe:

1.	$A \vee (B \rightarrow C)$		Zał.
2.	$\sim\sim[A \vee (B \rightarrow C)]$		Neg 1
3.	$\sim\sim A \vee (B \rightarrow C)$		Neg 1
4.	$A \vee \sim\sim(B \rightarrow C)$		Neg 1
5.	$A \vee (\sim\sim B \rightarrow C)$		Neg 1
6.	$A \vee (B \rightarrow \sim\sim C)$		Neg 1

Nie wolno natomiast stosować reguł podstawiania jednocześnie do paru członów. Nieuzasadniony zatem byłby krok:



7.	$\sim\sim A \vee (\sim\sim B \rightarrow C)$		Neg 1
----	--	--	-------

Ćwiczenie III.

Ponieważ reguły podstawiania można stosować również do członów zdań, więc często będzie wiele sposobów zastosowania danej reguły do pewnego zdania. Uzupełnij brakujące informacje.

(a)

1.	$C \equiv D$	Zał.
2.		Neg 1
3.		Neg 1
4.		Neg 1

(b)

1.	$\sim A \vee \sim B$	Zał.
2.		Neg 1
3.		Neg 1
4.		Neg 1

(c)

1.	$C \bullet \sim \sim A$	Zał.
2.		Neg 1
3.		Neg 1
4.		Neg 1
5.		Neg 1

(d)

1.	$\sim \sim (B \rightarrow \sim C)$	Zał.
2.		Neg 1
3.		Neg 1
4.		Neg 1
5.		Neg 1

(e)

1.	$\sim (A \vee \sim (B \bullet C))$	Zał.
2.		DeM 1
3.		DeM 1

(f)

1.	$\sim (\sim D \bullet \sim (A \vee C))$	Zał.
2.		DeM 1
3.		DeM 1
4.		DeM 1

(g)

1.	$\sim (\sim (\sim A \vee \sim C) \vee \sim (\sim B \bullet \sim D))$	Zał.
2.		DeM 1
3.		DeM 1
4.		DeM 1
5.		DeM 1
6.		DeM 1

(h)

1.	$C \equiv B$	Zał.
2.		Idem 1
3.		Idem 1
4.		Idem 1
5.		Idem 1
6.		Idem 1
7.		Idem 1

(i)

1.	$\sim (A \bullet D)$	Zał.
2.		Idem 1
3.		Idem 1
4.		Idem 1
5.		Idem 1
6.		Idem 1
7.		Idem 1

(j)

1.	$(A \vee B) \bullet (C \equiv D)$	Zał.
2.		Przem 1
3.		Przem 1
4.		Przem 1

(k)

1.	$(A \bullet B) \bullet (C \bullet D)$	Zał.
2.		Łącz 1
3.		Łącz 1

(1)		
1.	$(A \vee B) \cdot (C \vee D)$	Zał.
2.		Rozdz 1
3.		Rozdz 1
4.		Rozdz 2
5.		Rozdz 2
6.		Rozdz 2
7.		Rozdz 3
8.		Rozdz 3
9.		Rozdz 3

Ćwiczenie IV.

Wykaż, że następujące równoważne symbolizacje zdań z wcześniejszych ćwiczeń *Samouczka* są logicznie równoważne:

- | | | |
|-----|---|--|
| (a) | Teoria F reuda jest prawdziwa, chyba że albo teoria J unga, albo teoria A dlera jest prawdziwa. | $(J \vee A) \vee F$
$\sim(J \vee A) \rightarrow F$ |
| (b) | B eata pójdzie z L echem na randkę chyba, że albo po raz kolejny L ech się S późni, albo znów nie przyniesie jej K wiatów. | $(S \vee \sim K) \vee B$
$\sim(S \vee \sim K) \rightarrow B$ |
| (c) | M arcin przejdzie na dietę tylko wtedy, gdy L idka – lecz nie K alinka – przejdzie na dietę. | $M \rightarrow (L \cdot \sim K)$
$\sim(L \cdot \sim K) \rightarrow \sim M$
$(\sim L \vee K) \rightarrow \sim M$ |
| (d) | Z aliczysz logikę, tylko jeżeli zarówno wszystko Z rozumiesz, jak i będziesz poprawnie wykonywać wszystkie Ć wiczenia. | $Z \rightarrow (R \cdot \acute{C})$
$\sim(R \cdot \acute{C}) \rightarrow \sim Z$
$(\sim R \vee \sim \acute{C}) \rightarrow \sim Z$ |